


## OBJAWY WSPÓLNE



## PRZED ZDIAGNOZOWANIEM CELIAKII U DZIECI - WYKLUCZ ALERGIĘ NA MLEKO<sup>1</sup>

### ✓ Celiakia IgA + Total i IgG

Polycheck <sup>®</sup> Celiakia IgA	Polycheck <sup>®</sup> Celiakia IgG
<b>Antygeny:</b>	<b>Antygeny:</b>
DGP IgA (deamidowany peptyd gliadyny)	DGP IgG (deamidowany peptyd gliadyny)
tTG IgA (transglutaminaza tkankowa)	tTG IgG (transglutaminaza tkankowa)
Total IgA <b>NOWOŚĆ</b>	Intrinsic factor

do **100%**  
wykrywalności CELIAKII

przy **2 testach** jednocześnie<sup>2</sup>

### ✓ Mleko plus gluten

Polycheck <sup>®</sup> Mleko plus gluten
<b>Alergen</b>
f02 Mleko krowie
f76 Bos d 4 α-laktoalbumina
f77 Bos d 5 β-laktoglobulina
f78 Bos d 8 kazeina
e204 Bos d 6 (BSA) surowicza album. woł.
f79 Gluten

**Bos d 6**

marker alergii na mleko i wołowinę  
potencjalne reakcje krzyżowe:  
wieprzowina i naskórki zwierząt

**Bos d 4 Bos d 5 Bos d 8**

pierwotne uczulenie na mleko

Testy Polycheck<sup>®</sup> - można wykonać w:



**ANMED**  
Laboratorium Analiz  
Medycznych

Więcej informacji:

e-mail: [anmed.lab@wp.pl](mailto:anmed.lab@wp.pl)  
[www.anmed-lab.pl](http://www.anmed-lab.pl)

Generalny dystrybutor Polycheck<sup>®</sup>

**EMMA**  
Medical Diagnostic Tests